F.R.S.



E.R.S.



2 LOI DE FRYETTE

"Quand les facettes articulaires sont en état d'engagement (gravité antérieure au delà de 10° ou gravité postérieure), celle-ci vont se présenter soit en divergence ou convergence. La rotation va précéder l'inclinaison, les deux mouvements iront dans le même sens.Soit E.R.S ou F.R.S"

Ou: "2 COCA"



TESTS TMA

- PALPATION
  - Réaliser une palpation clinique des apophyses épineuses, des transverses,des zones articulaires,ligaments,muscles etc...
  - Vu durant le cours....



Test de BEEVOR

- Genoux fléchis avec les pieds sur le plan de travail. Demander au patient un décollement du tronc de 30°. Si on observe un déviation de l'ombilic d'un côté, c'est que les abdominaux tracte plus fortement d'un côté que de l'autre.

- Ce test traduit une lésion au niveau de la moelle épinière.

- - Spondylolisthésis

TECHNIQUE DE BOOMERANG

1 Positionner le P en lumbarol



Le T réalise un mouvement rapide de S . *Eviter tout mouvement de rotation*

3

2

Le T positionne la main caudal en appui sur la crête iliaque et la main céphalique sur le grill costal.

Correction ERSL3 Droite

TECHNIQUE DE *Jackson*

Sciatagie gauche (attitude croisée)ou sciatalgie droite (attitude directe).

Position du membre inférieur de façon à diminuer la compression sur la racine nerveuse.

Le T réalise un mouvement rapide de side avec le tronc en direction droite.

Le T fixe l'iliaque sur la table.