


Thérapie sacro-occipitale

Cette T.S.O. a été mise au point par DE JARNETTE - chiropracteur - élève de D.D. Palmer et de W.G. Sutherland. Cette T.S.O. est basée sur les THRUSTS ostéopathiques et chiropractiques, et sur l'utilisation du BLOCKING du bassin, monitorés par des signes cliniques, des tests biomécaniques et l'applied Kinesiology.

Après plusieurs années d'études cliniques, DE JARNETTE a classé ses patients en 3 catégories distinctes.


- La catégorie 1 dite chronique - correspond aux patients ayant des problèmes dure-mériens ou viscéraux.
- **La catégorie 2 - patients ayant des problèmes de lumbagos sacro-iliaques et des problèmes de cervicales.**
- La catégorie 3 - patients ayant des problèmes discaux lombaires (lumbagos -sciatiques - hernie discale ...) essentiellement au niveau des 3 dernières lombaires aux premières cervicales par la loi de LOVETT.

Catégorie II




Test de la catégorie II:

L' ARM FOSSEA : Thérapie localisation des fosses iliaques Test pathognomonique de la catégorie II.



Position des blocs: catg. 2




Iliaque antérieur :

Jambe longue et rotation interne

Iliaque postérieur :

Jambe courte et rotation externe





Normalisation ilio-fémorale.

Test:

Le sujet est en décubitus sur les blocs. Le praticien palpe la face postérieure du grand trochanter à la recherche d'une douleur.

Correction :

Sujet en décubitus sur les blocs. Le praticien se place du côté opposé à la lésion et agrippe le grand trochanter des deux mains. On demande une rotation interne active du membre inférieur, tout en exerçant une traction vers le haut. On maintient cette traction tandis que le patient réalise une rotation externe active du membre inférieur, puis on exerce un thrust en fin de course. On répète la technique jusqu'à non douleur. La lésion peut être unilatérale ou bilatérale.

